



Flortis®



NATURAE TRIPLA AZIONE CONTRO INSETTI E MALATTIE - PRONTO ALL'USO 1000 ML

Codice: 1331865

Alt afidi, acari e oidio Con speciale e innovativo nebulizzatore spray

COMPOSIZIONE Estratto di equisetto (*Equisetum arvense*) 0,75%, estratto di ortica (*Urtica dioica*) 0,75%

FORMULAZIONE Liquido pronto all'uso

CONFEZIONI Flacone da 1000 ml



Flortis®

www.flortis.it - info.orvital@orvital.it

Orvital S.p.A.

SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)



Florlis®

Caratteristiche

Prodotto a base di estratto di equisetto (*Equisetum arvense*) e di ortica (*Urtica dioica*).

Applicato sulle piante, svolge una tripla azione contro insetti, acari e malattie. L'estratto di equisetto è ricco di flavonoidi, saponosidi, alcaloidi e silicati sotto forma di silice, sostanze in grado di rinforzare i tessuti delle piante inibendo lo sviluppo di malattie fungine, in particolare mal bianco o oidio, peronospora, ticchiolatura, botrite, bolla del pesco, alternaria e septoria.

Le sostanze urticanti presenti nell'ortica aiutano le piante a proteggersi in presenza di insetti succhiatori, in particolare, afidi, tripidi e mosche bianche, e di acari o ragnetti rossi.

L'ortica è molto ricca di ferro e aiuta anche a prevenire e curare la clorosi ferrica.

Il prodotto svolge inoltre un'azione fitostimolante in casi di piante debilitate o stressate da situazioni climatiche avverse, promuovendone la crescita e rendendole più forti, più verdi, con più fiori e frutti. È applicabile su tutti i tipi di piante e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Modalità di utilizzo

Agitare bene prima dell'uso e nebulizzare la pianta da una distanza di 30 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione ogni 7-10 giorni dopo il primo trattamento. Per le colture edibili, si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal trattamento prima di consumare il raccolto.